



ANDAMENTO METEOROLOGICO	MALATTIA	TRATTAMENTI a partire dal 21 06 2018
PERONOSPORA		
<p>INSTABILE CON PIOGGE</p> <p>LIVELLO DI ATTENZIONE SU PERONOSPORA ESTESO SU TUTTA LA CALABRIA – REGISTRATE PIOGGE SU TUTTA LA REGIONE: si rileva la riduzione della suscettibilità della pianta alla malattia; quasi ovunque ci si trova in fase di pre-chiusura grappolo salvo in alcune zone di alta collina dove è da poco conclusa la fase di allegagione.</p> <p>I vigneti controllati non presentano macchie d'olio né infezioni primarie che hanno generato sporulazione. Tuttavia le piogge verificatesi in modo intermittente dal 14 giugno al 20 giugno IMPONGONO IL RICORSO A TRATTAMENTI SPECIFICI CON PRODOTTI SISTEMICI O CITOTROPICI.</p>		<p>Aziende convenzionali Intervenire utilizzando prodotti sistemici in associazione con un prodotto di copertura: Fuopicolide+Fosetil-AI oppure con Ciazofamide (grazie alla presenza di fosfiti, garantisce anche capacità sistemiche), Mandipropamide, Dimetomorf+Rame o Iprovalicarb+Rame o metalaxyl+rame. Interessante in questa fase di instabilità con probabilità di piogge è la Zoxamide, resistente al dilavamento fino a 60 mm di pioggia.</p> <p>Aziende biologiche Si deve continuare a mantenere la copertura della vegetazione con i rameici e ripristinarla al suo scadere o in caso di dilavamento. Si ricorda che sono ammessi fino a 6 kg/ha/anno di rame (principio attivo).</p>
OIDIO		
<p>ALLERTA: IN VIGNETI IN ZONE COLLINARI VENTILATE, CON VARIETA' SUSCETTIBILI, IN ANNATE CON ALTERNANZA PIOGGIA / ASCIUTTO.</p> <p>Segnalati, focolai della malattia nella LOCRIDE</p> <p>Nel cosentino ancora ridotta pressione.</p>		<p>Aziende convenzionali</p> <ul style="list-style-type: none"> Nella fase di pre-chiusura del grappolo preferire applicazioni con zolfo polverulento. In caso di forte pressione della malattia aggiungere dello zolfo bagnabile al prodotto sistemico. Tutti i prodotti antioidici hanno azione principalmente preventiva <p>Aziende biologiche In questo periodo utilizzare zolfo sia in polvere che bagnabile. Trattare nelle ore più fresche della giornata. Prodotti sperimentali Bicarbonato di sodio e potassio</p>
FASE FENOLOGICA		
<p>Area del Cosentino - DOP TERRE DI COSENZA Dal comune di Paterno, a Donnici e fino a Bisignano.</p> <p>Magliocco e Mantonicoe Syrah tra sviluppo del grappolo e acini che iniziano a toccarsi (BBCH 75-77).</p> <p>Gaglioppo, Sangiovese e Merlot tra pre-chiusura e chiusura grappolo (BBCH 77/79).</p> <p>Cabernet sauvignon: prechiusura del grappolo (BBCH 77).</p> <p>Chardonnay: chiusura grappolo (BBCH 79).</p> <p>Nelle zone di alta collina (Belsito-Acri) siamo tra le fasi di fine allegagione e inizio sviluppo del grappolo.</p> <p>Per informazioni Ce.D.A. n. 7 "Vallo di Cosenza" 0984 683.216</p>	<p>Area della Locride - DOC BIVONGI – DOC GRECO DI BIANCO - Da Bivongi, Caulonia fino a Casignana e Bianco.</p> <p>DOC GRECO DI BIANCO Greco di Bianco, fase fenologica di chiusura grappolo (BBCH 77). DOC BIVONGI Greco di bianco, Greco Nero, fase di chiusura grappolo (BBCH 77).</p> <p>Per informazioni Ce.D.A. n. 21 "Locride" 0964 21968</p> <p>PER RIDURRE IL RISCHIO D'INSORGENZA DI RESISTENZE ALTERNARE PRINCIPI ATTIVI CON DIVERSO MECCANISMO D'AZIONE</p>	
<p>LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE E RISPETTARE LE DOSI INDICATE CHIEDERE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA AL PROPRIO RIVENDITORE DI PRODOTTI FITOSANITARI.</p>		