



ANDAMENTO METEO	MALATTIA	TRATTAMENTI
<b>PERONOSPORA</b>		
<p><b>INSTABILE CON PIOGGE</b></p> <p><b>LIVELLO DI ATTENZIONE SU PERONOSPORA ESTESO SU TUTTA LA CALABRIA – REGISTRATE PIOGGE SU TUTTA LA REGIONE: ALLERTA</b></p> <p>nonostante si rilevi la riduzione della suscettibilità della pianta alla malattia; quasi ovunque ci si trova in fase di chiusura grappolo salvo in alcune zone di alta collina dove ci si trova in fase di ingrossamento del grappolo.</p> <p><i>I vigneti controllati nel cosentino non presentano macchie d'olio né infezioni primarie che hanno generato sporulazione. Nella Locride sono presenti vigneti con macchie d'olio.</i></p> <p>Le piogge verificatesi negli ultimi 7 giorni <b>IMPONGONO IL RICORSO A TRATTAMENTI SPECIFICI</b> (vedi riquadro).</p>		<p><b>Aziende convenzionali</b></p> <p>Intervenire utilizzando prodotti sistemici in associazione con un prodotto di copertura:</p> <p><b>Fuopicolide+Fosetil-Al</b> oppure con <b>Ciazofamide</b> (<i>grazie alla presenza di fosfiti, garantisce anche capacità sistemiche</i>), <b>Mandipropamide</b>, <b>Dimetomorf+Rame o Iprovalicarb+Rame o metalaxyl+rame</b>.</p> <p>Interessante in questa fase di instabilità con probabilità di piogge è la <b>Zoxamide</b>, resistente al dilavamento fino a 60 mm di pioggia.</p> <p><b>Aziende biologiche</b></p> <p>Si deve continuare a <b>mantenere la copertura della vegetazione con i rameici e ripristinarla al suo scadere</b> o in caso di dilavamento. Si ricorda che sono ammessi fino a <b>6 kg/ha/anno</b> di rame (principio attivo).</p>
<b>OIDIO</b>		
<p><b>ALLERTA: IN VIGNETI IN ZONE COLLINARI VENTILATE, CON VARIETA' SUSCETTIBILI, IN ANNATE CON ALTERNANZA PIOGGIA /ASCIUTTO.</b></p> <p>Segnalati, focolai della malattia nella <b>LOCRIDE</b></p> <p>Nel cosentino ancora ridotta pressione.</p>		<p><b>Aziende convenzionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nella fase di pre-chiusura del grappolo preferire applicazioni con zolfo polverulento.</li> <li>In caso di forte pressione della malattia aggiungere dello zolfo bagnabile al prodotto sistemico.</li> </ul> <p>Tutti i prodotti antioidici hanno azione principalmente preventiva.</p> <p><b>Aziende biologiche</b></p> <p>In questo periodo utilizzare zolfo sia in polvere che bagnabile. Trattare nelle ore più fresche della giornata.</p> <p><b>Prodotti sperimentali:</b> Bicarbonato di Na</p>
<b>FASE FENOLOGICA</b>		
<p><b>Area del Cosentino - DOP TERRE DI COSENZA</b> Dal comune di Paterno, a Donnici e fino a Bisignano.</p> <p><b>Magliocco e Mantonicoe Syrah</b> tra sviluppo del grappolo e acini che iniziano a toccarsi (BBCH 75-77).</p> <p><b>Gaglioppo, Sangiovese e Merlot</b> tra pre-chiusura e chiusura grappolo (BBCH 77/79).</p> <p><b>Cabernet sauvignon:</b> prechiusura del grappolo (BBCH 77).</p> <p><b>Chardonnay:</b> chiusura grappolo (BBCH 79).</p> <p>Nelle zone di alta collina (Belsito-Acri) siamo tra le fasi di fine allegagione e inizio sviluppo del grappolo.</p> <p><b>Per informazioni Ce.D.A. n. 7 "Vallo di Cosenza" 0984 683.216</b></p>	<p><b>Area della Locride - DOC BIVONGI – DOC GRECO DI BIANCO</b> - Da Bivongi, Caulonia fino a Casignana e Bianco.</p> <p><b>DOC GRECO DI BIANCO</b></p> <p><b>Greco bianco</b>, fase fenologica di chiusura grappolo (BBCH 77).</p> <p><b>DOC BIVONGI</b></p> <p><b>Greco bianco, Greco Nero</b>, fase di chiusura grappolo (BBCH 77).</p> <p><b>Per informazioni Ce.D.A. n. 21 "Locride" 0964 21968</b></p> <p><b>PER RIDURRE IL RISCHIO D'INSORGENZA DI RESISTENZE ALTERNARE PRINCIPI ATTIVI CON DIVERSO MECCANISMO D'AZIONE</b></p>	
<p><b>LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE E RISPETTARE LE DOSI INDICATE. CHIEDERE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA AL PROPRIO RIVENDITORE DI PRODOTTI FITOSANITARI.</b></p>		