

ARSAC
BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO E DI DIFESA FITOSANITARIA
(AGRUMI - OLIVO)
AREA 2-COSENZA IONICA

Bollettino n del 21/04/2020 valido fino al 28/04 2020

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Dati meteorologici: media dal 15 aprile al 21 aprile 2020

Stazione	Tmed	Tmin	Tmax	URmed	Piog. Tot.
Mirto (CS)	15,2	10,6	19,5		4,4
Mirto (CS) (settimana precedente)	15,6	9	22,5		0

Legenda:
T med = Temp. media (°C)
T min = Temp. media minima (°C)
T max = Temp. media massima (°C)
Urmed = Umidità Rel. media (%)
Pioggia = Precipitazioni totali (mm)

Dal 15 aprile al 21 aprile: il tempo è caratterizzato dalla alta pressione che staziona sulla regione che assicura cielo sereno, alla fine della settimana si verificano delle incursioni di perturbazioni atlantiche che portano venti meridionali e instabilità con conseguente innalzamento delle temperature e leggere precipitazioni.

AGRUMI

Fase fenologica: "**Fioritura**".

SITUAZIONE FITOSANITARIA ED OPERAZIONI COLTURALI

Dai rilievi eseguiti in campo non si rilevano infezioni od infestazioni di patogeni superiori alle soglie d'intervento.

PROGRAMMA DI DIFESA INTEGRATA

Nessun intervento fitosanitario.

OLIVO

Fase fenologica : “Mignolatura”

SITUAZIONE FITOSANITARIA ED OPERAZIONI COLTURALI

Dai rilievi eseguiti in campo non si rilevano infezioni od infestazioni di patogeni superiori alle soglie d'intervento fatta eccezione di evidenti sintomi su foglie adulte di vecchi attacchi di Occhio di Pavone. In questa fase la nuova vegetazione è suscettibile a nuovi attacchi del fungo. Si consigliano concimazioni equilibrate.

PROGRAMMA DI DIFESA INTEGRATA

Occhio di Pavone (*Spilocaea oleaginea*): considerata la fase fenologica si consiglia nelle aziende che nella passata stagione hanno riscontrato danni da Occhio di Pavone, un trattamento con prodotti a base di rame (ossicloruri, poltiglia bordolese, ecc) o con dodina nei casi di infezioni più gravi.

Oziorrinco (*Otiorhynchus cribricollis*): Nei giovani impianti sistemare sul tronco le fasce di lana di vetro di vetro per ostacolare la risalita dal terreno dei fitofagi defogliatori quali l'Oziorrinco particolarmente attivo nel periodo maggio-giugno.



Fascia di lana di vetro



Occhio di pavone

Le sostanze attive consigliate sono quelle previste dai Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Calabria attualmente in vigore

BOLLETTINO A CURA DEL SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO ARSAC
E-mail agrometereologia@arsac.calabria.it

RILIEVI AGROFENOLOGICI E PROGRAMMI DI DIFESA

Cufari Francesco;
Di Leo Antonio;
Lanza Domenico;
Liguori Vincenzo
Pittore Pietro
Salandria Giuseppe

CENTO DI DIVULGAZIONE AGRICOLA N° 3 SIBARI TEL 098374081
CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO DI MIRTO TEL 098342235