

**ARSAC**  
**BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO E DI DIFESA FITOSANITARIA**  
**(VITE - AGRUMI - OLIVO)**  
**AREA 3 - PIANA DI LAMEZIA**

*Bollettino del 14/04/2020 valido fino al 21/04/2020*

**SITUAZIONE METEOROLOGICA**

**Dati meteorologici: media dal 31 marzo al 07 aprile 2020**

<b>Stazione</b>	<b>Tmed C°</b>	<b>Tmin C°</b>	<b>Tmax C°</b>	<b>Urmed %</b>	<b>Piog. Tot mm</b>
<b>Lamezia Terme (aeroporto)</b>	13,3	6,6	18	82,0	n/p
<b>Lamezia Terme (aeroporto) (31/03 - 07/04)</b>	11,6	5	16	78,1	n/p
<b>Media climatica del mese (aprile)</b>	13,5	9	18	73	68

Legenda:

T med = Temp. media (°C)  
T min = Temp. media minima (°C)  
T max = Temp. media massima (°C)  
Urmed = Umidità Rel. media (%)  
Pioggia = Precipitazioni totali (mm)

Dal 07 aprile al 14 aprile: i venti provenienti prevalentemente dai quadranti settentrionali e il cielo sereno hanno mantenuto le temperature mediamente inferiori alla media mensile attesa, a causa delle spiccate inversioni termiche notturne le minime sono inferiori anche ai valori della settimana precedente. Per effetto dell'abbondante soleggiamento, invece, le temperature massime si attestano sui valori medi di aprile; è da imputare proprio a questa elevata escursione termica l'alto tasso di umidità, che anche in assenza di piogge può realizzare le condizioni necessarie alle infezioni fungine, favorite anche dalle elevate temperature diurne.

**VITE**

La fase fenologica è quella dei germogli lunghi 10 cm.

**SITUAZIONE FITOSANITARIA ED OPERAZIONI COLTURALI**

Dai rilievi in campo nel vigneto ubicato nel comune di Pianopoli si segnala la presenza di peronospora e oidio

**DIFESA INTEGRATA**

Per la Peronospora si consiglia di eseguire al più presto un intervento fitosanitario con un fungicida rameico. Per l'oidio si consiglia un trattamento con zolfo ventilato.

## **AGRUMI**

La coltura si trova in ripresa vegetativa in particolare predomina la fase di “ inizio fioritura – piena fioritura”.

### **SITUAZIONE FITOSANITARIA ED OPERAZIONI COLTURALI**

In fase di fioritura non si consigliano interventi fitosanitari.

Per una buona impollinazione dei fiori e il miglioramento qualitativo della produzione si consiglia di posizionare all'interno dell'agrumeto delle arnie (almeno 2 per ettaro).

## **OLIVO**

Le piante sono in fase di mignolatura

### **SITUAZIONE FITOSANITARIA ED OPERAZIONI COLTURALI**

Sulle foglie si evidenziano attacchi di *Spilotea aeginea* (Occhio di Pavone), in questa fase la nuova vegetazione è suscettibile a nuovi attacchi del fungo

### **DIFESA INTEGRATA**

Si consiglia di intervenire con un fungicida rameico, le dosi consigliate sono 300-400 g/hl al 50% di rame per l'ossicloruro e di 1-1,5kg/hl per quanto riguarda la poltiglia bordolese.

BOLLETTINO A CURA DEL SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO ARSAC  
E-mail [agrometereologia@arsac.calabria.it](mailto:agrometereologia@arsac.calabria.it)

-----  
RILIEVI AGROFENOLOGICI E PROGRAMMI DI DIFESA  
A CURA DEL CSD San Pietro Lametino  
RESPONSABILE: DR L. IULIANO