

**ARSAC**  
**BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO E DI DIFESA FITOSANITARIA**  
**(VITE - AGRUMI - OLIVO)**  
**AREA 3 - PIANA DI LAMEZIA**

**Bollettino n 3 del 12/05/2020 valido fino al 19/05/2020**

**SITUAZIONE METEOROLOGICA**

**Dati meteorologici: media dal 06 al 12 maggio 2020**

<b>Stazione</b>	<b>Tmed C°</b>	<b>Tmin C°</b>	<b>Tmax C°</b>	<b>Urmed %</b>	<b>Piog. Tot mm</b>
<b>Lamezia Terme (aeroporto)</b>	17,7	13,9	20,7	82,71%	
<b>Lamezia Terme (aeroporto) (22/04 - 28/04)</b>	18,0	11,4	23,7	71,86%	-
<b>Media climatica del mese (Maggio)</b>	17	12	22	73,00%	9,25

**Legenda:**

T med = Temp. media (°C)  
T min = Temp. media minima (°C)  
T max = Temp. media massima (°C)  
Urmed = Umidità Rel. media (%)  
Pioviggia = Precipitazioni totali (mm)

Nella settimana dal 6 al 12 le temperature medie sono restate pressoché costanti ma vi è stata una diminuzione di diversi gradi nelle massime a causa di frequenti venti da nord - nord est che sono anche la causa dell'innalzamento dell'umidità anche restano assenti le precipitazioni.

**VITE**

La fase fenologica è quella dei grappoli separati al 100%, rilevazione su Cv di Magliocco Canino

**SITUAZIONE FITOSANITARIA ED OPERAZIONI COLTURALI**

Dai rilievi in campo nel vigneto ubicato nel comune di Pianopoli si segnala la presenza di peronospora e oidio

**PROGRAMMA DI DIFESA**

Trattamenti di boro in prefioritura per favorire l'allegagione. Per la Peronospora si consiglia di eseguire al più presto un intervento fitosanitario di copertura con un fungicida rameico, preventivi o sistemici. Per l'oidio si consiglia un trattamento con zolfo bagnabile o sistemico.

**AGRUMI**

La coltura si trova nella fase di "allegagione" e "frutticini verdi circondati dalla corolla dei sepali"

**SITUAZIONE FITOSANITARIA ED OPERAZIONI COLTURALI**

Al momento non si rilevano presenze di patogeni, per quanto riguarda le cure colturali, particolare importanza assume il controllo delle infestanti

**OLIVO**

*cultivar Carolea (posizione dell'oliveto controllato 250 m slm)*

Le piante hanno iniziato la fioritura

**SITUAZIONE FITOSANITARIA ED OPERAZIONI COLTURALI E DIFESA INTEGRATA**

Sulle foglie si evidenziano attacchi di Spilocaea aleinea (Occhio di Pavone), in questa fase la nuova vegetazione è suscettibile a nuovi attacchi del fungo pertanto si consiglia di intervenire con un fungicida rameico.

BOLLETTINO A CURA DEL SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO ARSAC  
E-mail [agrometereologia@arsac.calabria.it](mailto:agrometereologia@arsac.calabria.it)

-----  
RILIEVI AGROFENOLOGICI E PROGRAMMI DI DIFESA  
A CURA DEL CSD San Pietro Lametino  
RESPONSABILE: DR L. IULIANO