

**ARSAC**  
**BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO E DI DIFESA FITOSANITARIA**  
**(VITE - AGRUMI - OLIVO)**  
**AREA 3 - PIANA DI LAMEZIA**

*Bollettino n 4 del 19/05/2020 valido fino al 26/05/2020*

**SITUAZIONE METEOROLOGICA**

**Dati meteorologici: media dal 12 al 19 maggio 2020**

<b>Stazione</b>	<b>Tmed C°</b>	<b>Tmin C°</b>	<b>Tmax C°</b>	<b>Urmed %</b>	<b>Piog. Tot mm</b>
<b>Lamezia Terme (aeroporto)</b>	23,3	17,1	28,3	58,00%	-
<b>Lamezia Terme (aeroporto) (05/04 - 12/04)</b>	17,7	13,9	20,7	82,71%	-
<b>Media climatica del mese (Maggio)</b>	17	12	22	73,00%	9,25

Legenda:

T med = Temp. media (°C)  
T min = Temp. media minima (°C)  
T max = Temp. media massima (°C)  
Urmed = Umidità Rel. media (%)  
Pioggia = Precipitazioni totali (mm)

la settimana settimana in esame è contrassegnata da una perturbazione atlantica che attraversando il Mediterraneo in direzione sud-est ha investito la nostra Regione, all'inizio il fronte caldo ha provocato un innalzamento delle temperatura ed ampie velature del cielo, seguito da schiarite ed una condizione di instabilità che ha portato, giorno 16, le temperature massime a toccare il picco di 34°, lo stesso giorno le minime sono scese a 14° con la notevole escursione giornaliera di 20°. Con l'arrivo del fronte più freddo, tra il 18 ed il 19 maggio, le temperature sono rientrate nei valori attesi.

**VITE**

La fase fenologica è quella dei grappoli separati al 100%, rilevazione su Cv di Magliocco Canino

**SITUAZIONE FITOSANITARIA ED OPERAZIONI COLTURALI**

Dai rilievi in campo nel vigneto ubicato nel comune di Pianopoli si segnala la presenza di peronospora e oidio

**PROGRAMMA DI DIFESA**

Per la Peronospora si consiglia di eseguire al più presto un intervento fitosanitario di copertura con un fungicida rameico, preventivi o sistemici. Per l'oidio si consiglia un trattamento con zolfo bagnabile o sistemico (tebuconazolo)

**AGRUMI**

La coltura si trova in ripresa vegetativa in particolare predomina la fase di " Appassimento dei fiori con i petali a terra".

**SITUAZIONE FITOSANITARIA ED OPERAZIONI COLTURALI**

In fase di fioritura non si consigliano interventi fitosanitari.

**OLIVO**

*cultivar Carolea (posizione dell'oliveto controllato 250 m slm)*

Le piante hanno completato la mignolatura

**SITUAZIONE FITOSANITARIA ED OPERAZIONI COLTURALI E DIFESA INTEGRATA**

Sulle foglie si evidenziano attacchi di *Spilocea aleginea* (Occhio di Pavone), in questa fase la nuova vegetazione è suscettibile a nuovi attacchi del fungo pertanto si consiglia di intervenire con un fungicida rameico, le dosi consigliate sono 300-400 g/hl al 50% di rame per l'ossicloruro e di 1-1,5kg/hl per quanto riguarda la poltiglia bordolese.

BOLLETTINO A CURA DEL SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO ARSAC  
E-mail [agrometereologia@arsac.calabria.it](mailto:agrometereologia@arsac.calabria.it)

-----  
RILIEVI AGROFENOLOGICI E PROGRAMMI DI DIFESA  
A CURA DEL CSD San Pietro Lametino  
RESPONSABILE: DR L. IULIANO