

Bollettino n 5 del 26/05/2020 valido fino al 02/06/2020

SITUAZIONE METEOROLOGICA

Dati meteorologici: media dal 20 al 26 maggio 2020

Stazione	Tmed C°	Tmin C°	Tmax C°	Urmed %	Piog. Tot mm
Lamezia Terme (aeroporto)	19,1	13,7	23,3	81,29%	-
Lamezia Terme (aeroporto) (12 - 19 maggio)	23,3	17,1	28,3	58,00%	-
Media climatica del mese (Maggio)	17	12	22	73,00%	9,25

Legenda:

T med = Temp. media (°C)
T min = Temp. media minima (°C)
T max = Temp. media massima (°C)
Urmed = Umidità Rel. media (%)
Pioggia = Precipitazioni totali (mm)

Nella settimana in esame i dati evidenziano, una diminuzione delle temperature (medie -4,2°, minime -3,4° e massime -5°) che pur rimanendo sopra la media stagionale hanno valori più consoni al periodo. Il tasso di umidità media questa settimana è di 81 % in aumento rispetto alla settimana precedente.

VITE

Siamo nella fase fenologica di piena fioritura, inizio di allegagione e mignolatura rilevazione su Cv di Magliocco Canino

SITUAZIONE FITOSANITARIA ED OPERAZIONI COLTURALI

Dai rilievi in campo nel vigneto ubicato nel comune di Pianopoli si segnala la presenza di peronospora e oidio

PROGRAMMA DI DIFESA

rattamenti di boro in prefioritura per favorire l'allegagione. Per la Peronospora si consiglia di eseguire al più presto un intervento fitosanitario di copertura con un fungicida rameico, preventivi o sistemici. Per l'oidio si consiglia un trattamento con zolfo bagnabile o sistemico.

AGRUMI (pianura)

La coltura si trova nella fase dei "ingiallimento e cascola fisiologica".

SITUAZIONE FITOSANITARIA ED OPERAZIONI COLTURALI

Al momento non si rilevano presenze di patogeni, per quanto riguarda le cure colturali, particolare importanza assume il controllo delle infestanti, si raccomanda il monitoraggio relativo alla presenza di afidi.

Nel caso si può intervenire con prodotti a base di PIRETROIDI o prodotti naturali come AZADIRACHTIN.

Al fine di prevenire gli attacchi di afidi su agrumi si consiglia di intervallare nel campo di agrumi essenze odorose come lavanda, tanacetto o assenzio.

OLIVO

cultivar Carolea (posizione dell'oliveto controllato 250 m slm)

Le piante sono in fase di allegaggione

SITUAZIONE FITOSANITARIA ED OPERAZIONI COLTURALI E DIFESA INTEGRATA

Sulle foglie si evidenziano attacchi di *Spilocea aleginea* (Occhio di Pavone), in questa fase la nuova vegetazione è suscettibile a nuovi attacchi del fungo pertanto si consiglia di intervenire con un fungicida rameico.

BOLLETTINO A CURA DEL SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO ARSAC

E-mail agrometereologia@arsac.calabria.it

RILIEVI AGROFENOLOGICI E PROGRAMMI DI DIFESA

A CURA DEL CSD San Pietro Lametino

RESPONSABILE: DR L. IULIANO