



Azienda Regionale per lo Sviluppo
dell'Agricoltura Calabrese
Ce.D.A. n.4 "Media Valle del Crati"
C/da Casello. - San Marco Argentano

BOLLETTINO COLTURALE DEL PEPERONE PER IL COMPENSORIO DELLA "MEDIA VALLE DEL CRATI"

Bollettino n 1 del 17/05/2021
valido fino al 23/05/2021

Situazione meteorologica

Dati meteorologici: media dal 07 al 14 maggio 2021

Stazione	Tmed	Tmin	Tmax	URmed	Piog. Tot.
San Marco Argentano (CS)	18,96	11,95	25,81	62,5	1,4
Media climatica del mese	17,5	12,5	23,3	58,1	10

Legenda:

T med = Temp. media (°C)
T min = Temp. media minima (°C)
T max = Temp. media massima (°C)
Urmed = Umidità Rel. media (%)
Pioggia = Precipitazioni totali (mm)

SITUAZIONE CLIMATICA

Situazione meteorologica dal 07 al 14 maggio: la situazione meteo di questo inizio mese di maggio, è caratterizzata da temperature massime al di sopra della media per gran parte del periodo, mentre le minime sono più o meno nella media stagionale con un conseguente notevole excursus termico notte-giorno (14 °C di differenza, con punte di 20 °C). L'U.R. media è in aumento rispetto ai valori del periodo e si è avuta una persistenza notevole della bagnatura fogliare (18 ore totali). E' stata sostenuta anche la ventosità media (6,85 m/s) con punte di 9 m/s. Da rilevare valori alti dell'evaporato medio settimanale (6,5 mm/die), al di sopra dei valori medi del periodo.

FASE FENOLOGICA PEPPERONE

Nel nostro territorio in virtù delle piogge importanti avutesi nello scorso mese di aprile i trapianti sono ancora in pieno svolgimento. (vedi foto seguenti)



In generale dal monitoraggio si evidenzia un ritardo dei diversi trapianti nelle aziende produttrici.



Azienda Regionale per lo Sviluppo
dell'Agricoltura Calabrese
Ce.D.A. n.4 "Media Valle del Crati"
C/da Casello. - San Marco Argentano

le piante, nei pochi appezzamenti completati, si trovano nella fase di attecchimento post-trapianto. In particolare stanno emettendo nuove foglie e di pari passo con l'espansione radicale.



GESTIONE IRRIGUA

In questo momento, la delicata fase di trapianto richiede un terreno umido ma non eccessivamente bagnato, per evitare un raffreddamento eccessivo delle radici che può comprometterne l'attecchimento. In questa fase l'adozione della pacciamatura riveste un ruolo importante nel mantenimento di un giusto grado di umidità del terreno.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

INSETTI

Al momento non sono emersi particolari problemi, importante in questa fase è il monitoraggio dei voli afidici (alate migranti) da cui origineranno le colonie afidiche.

FUNGHI

Cancrena Pedale (*Phytophthora capsici*) per questo patogeno, nei terreni argillosi, o limosi, va prestata particolare attenzione alla gestione irrigua e un corretto drenaggio del terreno. Da evitare irrigazioni abbondanti, anche perché in questa fase non sono necessarie.

Per il resto, alla data odierna, non si segnalano altre avversità di rilievo



**Azienda Regionale per lo Sviluppo
dell'Agricoltura Calabrese**
Ce.D.A. n.4 "Media Valle del Crati"
C/da Casello. - San Marco Argentano

BOLLETTINO CULTURALE DEL PEPERONE

A CURA DEL Ce.D.A. 4 "MEDIA VALLE DEL CRATT" SAN MARCO ARGENTANO (CS)

RESPONSABILE: DR D. GARRITANO

Per ulteriori informazioni contattare il seguente recapito:

348/6067944

ore 09:00-13:00 Lun.-Ven.

E-mail: domenico.garritano@arsac.calabria.it