



Ce.D.A. n°3 Sibari
Tel./fax 0981-74081

N° 5
BOLLETTINO di DIFESA
FITOSANITARIA
del Limone

valido dal 16
al 31 Marzo 2026

Responsabile
Dr. Agr. LANZA Domenico



Consorzio di Tutela e
Valorizzazione del Limone
di Rocca Imperiale (CS)

	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>) Ragno Rosso (<i>Panonychus citri</i>)	Intervento chimico: Al superamento delle soglie di intervento: ➤ Per chi aderisce alla Produzione Biologica è consigliato un trattamento con <i>Olio bianco oppure Olio Essenziale di Arancio Dolce</i>, alle dosi indicate in etichetta. ➤ Per chi aderisce alla produzione Integrata Volontaria è consigliabile effettuare un trattamento con <i>OLIO MINERALE BIANCO</i> al 0,75-1 % attivato con <i>ACARICIDA</i> uova-larve-adulticida alle dosi indicate in etichetta. Pertanto opportuno effettuare una miscela utilizzando un principio attivo ad azione larvo-adulticida come <i>Cyflumetofen, Pyridaben o Tebufenpirad o Fenpyroximate</i> miscelato con un principio attivo ad azione ovo-larvicida come <i>Extiazox o Clofentezine</i>. Per chi aderisce alla Produzione Integrata obbligatoria oltre ai prodotti di cui sopra può utilizzare altri principi attivi registrati sul ragnetto e sul limone alle dosi riportate in etichetta. <i>In presenza di focolai di ragnetto (Tetranychus urticae), si consiglia di intervenire con olio bianco (1 kg per ql di acqua) attivato con un acaricida ovo-larvicida e un acaricida larva-adulticida, di quelli sopra menzionati.</i>
--	---	---

	Cocciniglia bianca del limone (<i>Aspidiotus spp.</i>)	Interventi di tipo agronomico: • Potature razionali, volte a favorire l'arieggiamento e l'illuminazione delle piante; • Concimazioni equilibrate; Intervento: E' preferibile intervenire in concomitanza del trattamento contro l'<i>Aonidiella aurantii</i>, in quanto i principi attivi utilizzati per questo patogeno sono efficaci anche sull'<i>Aspidiotus</i>. Intervento chimico: ➤ Per chi aderisce alla Produzione Biologica è consigliabile intervenire con <i>OLIO MINERALE BIANCO</i> al 1,5 % o <i>OLIO BIANCO ESTIVO</i> al 2,5 % ➤ Per chi aderisce alla Produzione Integrata volontaria è consigliabile intervenire con <i>OLIO MINERALE BIANCO</i> al 0,35 % attivato con <i>PYRIPROXYFEN</i> o <i>ISOCLAST</i> alle dosi indicate in etichetta.
	Cocciniglia rosso forte degli agrumi (<i>Aonidiella aurantii</i>)	Per chi aderisce alla Produzione Integrata Obbligatoria oltre a usare i prodotti di cui sopra, può usare anche gli altri (Flupyradifurone puro) che sono registrati sul limone, rispettando i limiti di legge.
<i>Negli impianti giovani o altri impianti adulti, dove non si è trattato l'anno precedente e comunque in presenza di manicotti di cocciniglia sui rami, è consigliabile intervenire con olio bianco a 1,5 kg per ql, attivato con uno dei principi attivi sopra indicati. E' Bene ricordare che è stato derogato l'utilizzo dello Spirotetramat (MOVENTO) per 120 giorni (dal 1 aprile al 29 luglio 2026) al fine di contrastare meglio alcuni fitofagi che risultavano difficoltosi nel controllo con altri insetticidi presenti sul mercato.</i>		



Mal secco
(*Phoma tracheiphila*)

Interventi di tipo agronomico:

- Impiegare piante e materiale di propagazione esenti da infezioni;
- Utilizzare cloni di limoni tolleranti;
- Rimuovere i rametti infetti nel periodo estivo (luglio-agosto) ed eliminarli con la bruciatura;
- Proteggere le piante dalle avversità climatiche;
- Evitare di danneggiare l'apparato radicale per prevenire le infezioni delle radici;
- Evitare di potare o raccogliere frutti subito dopo una pioggia o durante o poco prima (maggiore veicolazione dell'agente infettante).

Interventi chimici:

Intervenire subito dopo eventi meteorici avversi e durante i mesi piovosi (o dopo potature più o meno pesanti) con prodotto con **Ossicloruro di Rame** alle dosi riportate in etichetta.

Nota Bene = Questo intervento è valido sia per chi produce in **Regime di Biologico** che in **Regime di Integrato Volontario ed Obbligatorio**.

Considerato che le infezioni si hanno attraverso le ferite e soprattutto in condizioni caldo umide (autunno e primavera) e le spore sono facilitate nella veicolazione attraverso l'acqua, è consigliato evitare ferite anche con potatura e raccolta nei periodi bagnati.



Allupatura
(*Phytophora spp.*)

Interventi di tipo agronomico:

- Lasciare il terreno inerbito prime delle piogge invernali, evitando lavorazioni al terreno;
- Tenere le brachette produttive, con la potatura, almeno a 40-50 cm sollevati da terra;
- Tenere le piante ben arieggiate con la potatura;
- Evitare ristagni d'acqua.

Per chi aderisce alla **Produzione Biologica** è consigliabile intervenire con: **PRODOTTI A BASE DI RAME**. Per chi aderisce alla **Produzione Integrata Volontaria** è consigliabile effettuare un trattamento con:

- **PRODOTTI A BASE DI RAME;**
- **e/o PHOSETIL-AL**

alle dosi riportate in etichetta.

Ci sono anche prodotti con entrambi i principi attivi.

Negli impianti a raccolta medio-tardiva, intervenire con prodotti contenenti "rame" (possibilmente bianco) alle dosi riportate in etichetta.

INFORMAZIONI UTILI

PER CHI ADERISCE ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA O COMUNQUE VUOLE INTRODURRE E/O INTEGRARE LA DIFESA FITOSANITARIA CON TECNICA DI "BIOCONTROLLO" RELATIVAMENTE ALLE COCCINIGLIE, RAGNETTO, FORMICHE ED ALTRO, PUÒ INIZIARE A PRENDERE CONTATTI PER LA PROGRAMMAZIONE DEI LANCI ED EVENTUALMENTE L'INTEGRAZIONE CON LA TECNICA DI DIFESA PRATICATA.

Nuovi Impianti

Per chi è intenzionato a realizzare nuovi impianti può, iniziare i lavori. La prenotazione delle piante, è buona norma, in quanto avere le idee chiare di cosa impiantare (*varietà, portinnesto, comportamenti ed adattamenti ai vari areali, ecc.*) consente di trovare le piante che si intendono impiantare. Al fine di evitare investimenti sbagliati e sorprese deludenti, è opportuno farsi consigliare da tecnici specializzati, preparati

e, soprattutto, conoscitori delle piante e degli areali. Affidarsi completamente a solo vivaisti, praticoni e quant'altro, potrebbe causare problemi successivi, mettendo a rischio l'investimento.

Potatura -

Appena si stabilizza la temperatura, anche con l'allungamento delle ore di luce, si può iniziare con la potatura di sfoltimento, evitando grossi tagli.

Innesti -

Coloro che sono interessati ad innestare altre piante di agrumi (in pieno campo) è opportuno (salvo grandi variazioni termo-climatiche) predisporre ed organizzarsi *i lavori di innesto* orientativamente, per la terza decade di aprile.

Concimazione -

A partire dalla terza decade del mese, si può iniziare la concimazione. Al fine di evitare squilibri nutrizionali e, comunque, prima di effettuare eventuali concimazioni, sarebbe opportuno una visita in campo con il tecnico al fine di valutare, se effettuare le analisi del terreno per meglio calibrare le dosi dei nutrienti. Si ricorda che sono ammesse (*Secondo il Disciplinare di Produzione integrata volontaria*) le seguenti unità fertilizzanti:

- **Azoto** = 120 Kg/ha (con aumento o detrazione di 20 Kg/ha, a seconda delle situazioni specifiche) (in questo periodo max 50 unità);
- **Fosforo** = 20-100 Kg/ha (con aumento o con detrazione di 10/20Kg/ha, a seconda delle situazioni specifiche);
- **Potassio** = 50-120 Kg/ha (con aumento o con detrazione di 20/25Kg/ha, a seconda delle situazioni specifiche)) da frazionare tra primavera, estate e autunno;

In linea generale, in questa fase si potrebbe somministrare (sempre tenendo conto di cosa e di quanto è stato somministrato in autunno),

▪ su piante "in piena produzione":

- 4 – 4,5 q.li di 20-10-10 S (o concimi con titoli equivalenti) - (Integrato volontario) (*);
- Oppure
- 3,5 – 4 q.li di 11-22-16-S integrando con 1,5 - 2,0 q.li di Nitrato Ammonico 26% o Solfato Ammonico 21%
- Oppure
- 3,5 – 4 q.li di Nitrato Ammonico (26%) o 2,5 q.li di Nitram (34%) (Integrato volontario) (*)
- 3,5 – 4,0 q.li di Perfosfato Semplice (Integrato);
- 1,5 – 2,0 q.li di Solfato potassico (Integrato)

Sulle piante in produzione, con frutto ancora in attesa di raccolta (totale o parziale), è opportuno frazionare i dosaggi di cui sopra in 2 interventi (al fine di evitare il formarsi di buccia spessa e di squilibrare la pianta verso l'attività vegetativa a scapito di quella produttiva). Sulle piante già raccolte si può somministrare l'intero dosaggio.

▪ su piante "non in produzione" (2-3 anni):

- 200-500 gr per pianta (a seconda del tipo di concime che si dispone e della situazione specifica) di 25-10-0 oppure 25-15-0 oppure 20-10-10 oppure 20-5-10 oppure 15-5-5;
- 2-3 kg/pianta di stallatico o concime organico equivalente;
- Qualora vi fossero piantine che hanno difficoltà (stentano) alla ripresa vegetativa si può aiutarle con prodotti a base di biostimolanti sulle foglie e/o al terreno (radici).

Tutti i concimi vanno interrati con una leggera lavorazione, subito dopo la distribuzione.

Importante è evitare lavorazioni oltre 2-5 cm, con piante in attesa di raccolta.

(*) l'azoto si dovrebbe somministrare in due interventi anche a distanza di un mese l'uno dall'altro.

Lavorazioni del terreno

Per chi non ha ultimato la raccolta è preferibile evitare lavorazioni al terreno, anche quelle leggere, rimandandole a dopo l'ultimazione della raccolta. Nelle altre circostanze, si consiglia di effettuare lavorazioni al terreno leggere, solo per interrare i concimi. Per chi ha fatto il sovescio con favino può sfalciare e trinciare quando la pianta ha finito l'allegagione, lasciandola per qualche giorno disidratare.

Subito dopo, si può interrare con una lavorazione dopo aver preventivamente distribuito a spaglio circa 20-30 kg di urea.

Irrigazione

In caso di periodi di scarsa umidità del terreno, soprattutto negli impianti in produzione e con frutto non ancora raccolto, è consigliabile intervenire con qualche ora di irrigazione a cadenza settimanale, al fine di scongiurare l'asciugatura dei frutti.

Lavori preparatori

Per chi deve realizzare nuovi impianti, può preparare il terreno, fare la concimazione pre-impianto e sistemare (o montare) l'impianto di irrigazione.

Raccolta

Appena la pezzatura lo permette, effettuare una passata di raccolta parziale per quei frutti che hanno le caratteristiche commerciali. Tale raccolta parziale consentirà ai frutti che restano sulla pianta di raggiungere i requisiti commerciali (pezzatura compresa) in minor tempo e alla pianta di riprendersi dagli stress subiti.

E' importante rispettare gli intervalli di sicurezza.

AVVISO IMPORTANTE

Per qualsiasi problema di natura tecnica, si consiglia di rivolgersi al tecnico dell'**ARSAC** presso la sede del Consorzio:

Per qualsiasi problema di natura tecnica, si consiglia di rivolgersi al tecnico dell'ARSAC attraverso contatti telefonici (3283294392) nei giorni che precedono il venerdì (durante le ore di ufficio) al fine di programmare la visita aziendale.

Oppure al Consorzio

venerdì ore 8,30 – 12,30.

Oppure

**ARSAC - Centro di Divulgazione Agricolo n° 3 "Alto Ionio Cosentino"
– Via Nazionale S.S. n° 106 – Sibari (CS) Tel. 098174081**